

Pácienseknek

Altatás előtti teendők

- 6 órával a beavatkozás előtt ne fogyasszon ételt, és 3 órával előtte ne igyon.
- Amennyiben rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, arról mindenképpen tájékoztassa altatóorvosát.

Vérnyomáscsökkentő, illetve hormonkészítmény egy korty vízzel bevehető a szokásos időpontban.

Vércukor gyógyszer az altatás napján bevenni tilos.

Vérhígító szedéséről konzultáljon kezelőorvosával, mert egyes beavatkozásoknál nem megengedett.

- A kezelés napján, előre egyeztetett időpontban jelenjen meg a rendelőben. Fontos, hogy kényelmes ruhában (ha lehet, rövid ujjú felsőrészben) érkezzen, és a bal mutatóujján ne legyen körömlakk (ide érzékelőcsipesz kerül majd). Kérje meg egyik közeli hozzátartozóját, kedvesét, vagy barátját, hogy kísérje el Önt (hiszen a beavatkozás után szüksége lesz támogatásra, segítségre). Igény esetén Önnek lehetősége van szakképzett nővért kérni, ezzel kapcsolatban forduljon kezelőorvosához.

- A beavatkozás előtt aneszteziológus szakorvosunk megvizsgálja Önt, és minden felmerülő kérdésre készséggel válaszol.

Szundizz Velünk Kft.